

65. Mathematik-Olympiade 1. Runde (Schulrunde)

www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten. © 2025 Aufgabenausschuss für die Mathematik-Olympiade in Deutschland



Wahl von vier der sechs Aufgaben auch den Teilnehmenden überlassen werden. fen können. Wenn die erste Runde als Hausaufgabenwettbewerb durchgeführt wird, kann die Aufgaben zur Verfügung, aus denen die Verantwortlichen vor Ort eine geeignete Auswahl tref-<u> Hinweise:</u> 1. Für die Olympiadeklassen 9 und 10 stehen in der ersten Runde insgesamt sechs

gene Aussagen sind zu beweisen, falls sie nicht aus dem Schulunterricht bekannt sind. Auf und grammatisch einwandfreien Sätzen dargestellt werden. Zur Lösungsgewinnung herangezo-2. Der Lösungsweg mit Begründungen und Nebenrechnungen soll deutlich erkennbar in logisch eine Beweisangabe kann außerdem verzichtet werden, wenn die Aussage einen eigenen Namen besitzt und dadurch als allgemein bekannt angesehen werden kann.

gegenüberliegen. Die Gitterquadratseiten seien Einheitsstrecken (haben also die Länge 1). Geßerer Rand ist ein Rechteck, bei dem Start- und Zielpunkt einander als Eckpunkte diagonal Startpunkts liegt. In den Grafiken sind die Gitterlinien als gepunktete und die Wege als fette Quadratgitters (wie Abbildung A651011 a) liegen und deren Zielpunkt rechts unterhalb des fragt wird jeweils nach der Anzahl der kürzesten Wege vom Start- zum Zielpunkt auf dem In allen Aufgabenteilen betrachten wir Wegepläne, deren Wege auf den Gitterlinien eines Wegeplan. Die Antwort kann in a) und in b) ohne Begründung angegeben werden. Linien dargestellt (siehe Abbildung A651011 b). Die Wegepläne sind rechteckig, d.h. ihr äu-

- a) Wie viele kürzeste Wege von A nach G und wie viele kürzeste Wege von A nach H gibt es in Abbildung A 651011b?
- b) Wie viele kürzeste Wege von A nach B gibt es in Abbildung A 651011b?



A 651011 b

c) Entwerfen Sie einen rechteckigen Wegeplan mit einem Startpunkt A und einem weiter nach rechts bzw. von oben nach unten durchlaufen werden. Hier ist nachzuweisen, dass von A nach B gibt. Wege zählen dabei nur als kürzeste Wege, wenn sie nur von links rechts und weiter unten liegenden Zielpunkt B, in welchem es genau 20 kürzeste Wege

bildung (Abbildung A651011 a) abweichen. Himweis: Das zugrunde gelegte Quadratgitter darf von der Größe 3×4 der Beispielab

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

In dieser Aufgabe sind a und b positive ganze Zahlen

- a) Geben Sie alle Lösungen (a, b) der Gleichung $a^2 + b^2 = 65$ an.
- b) Geben Sie alle Lösungen (a,b)der Gleichung $a^2+b^2=340$ an.
- c) Hat die Gleichung $a^2 + b^2 = 8024$ Lösungen, bei denen a und b ebenfalls positive ganze Zahlen sind?

(2,3) und (3,2), denn es gilt Hinweis: Die Gleichung $a^2+b^2=13$ hat im Bereich der positiven ganzen Zahlen die Lösungen

$$2^2 + 3^2 = 3^2 + 2^2 = 13.$$

ersetzt werden, sodass alle Gleichungen erfüllt sind und in c) mit sechs Unbekannten untersucht. Die Variablen sollen dabei durch reelle Zahlen In dieser Aufgabe werden drei lineare Gleichungssysteme mit zunächst in a) und b) jeweils vier

a) Bestimmen Sie alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems

$$a+b+c=1$$
 (1)
 $b+c+d=2$ (2)
 $c+d+a=3$ (3)
 $d+a+b=4$ (4)

$$c + d + a = 3$$
 (3)
 $d + a + b = 4$ (4)

b) Zeigen Sie, dass das folgende Gleichungssystem keine Lösung hat *Hinweis*: Erkennen Sie, wie man zuerst die Summe a + b + c + d bestimmen kann?

$$a+b=0$$
 (1)
 $b+c=0$ (2)
 $c+d=0$ (3)
 $d+a=1$ (4)

c) Geben Sie zwei verschiedene Lösungen des folgenden Gleichungssystems an

d + a = 1

c + d + e = 0	b + c + d = 0	a+b+c=0
(3)	(2)	(1)

$$c + d + e = 0 \tag{3}$$

$$d + e + f = 0 \tag{4}$$

$$e + f + a = 0 \tag{5}$$

$$f + a + b = 0 \tag{6}$$

$$f + a + b = 0 \tag{6}$$

Auf der nächsten Seite geht es weiter!

N

651014

In dieser Aufgabe sollen Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Dabei werden zufällig zwei bzw. drei Zahlen ohne Zurücklegen (bzw. mit einem Griff) aus der Menge der aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen {2025, 2026, 2027, ..., 2039, 2040} gezogen.

- a) Es werden genau zwei Zahlen gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die positive Differenz der beiden Zahlen durch 6 teilbar?
- b) Es werden genau drei Zahlen gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit beträgt die Summe der drei Zahlen mindestens 6116?

Hinweis: Zufälliges Ziehen soll bedeuten, dass alle Möglichkeiten des Ziehens von zwei bzw. drei Zahlen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit eintreten.

651015

In einem rechtwinkligem Koordinatensystem sind die vier Punkte A(-1,0), B(b,3), C(1,6) und D(-3,2) gegeben. Dabei ist b eine reelle Zahl größer als -2.

Bestimmen Sie jeweils alle Werte von b, für die

- a) die vier Punkte ein bei C rechtwinkliges Viereck ABCD bilden,
- b) die vier Punkte ein Trapez ABCD bilden,
- c) die vier Punkte ein Sehnenviereck ABCD bilden,
- d) die vier Punkte ein Viereck ABCD mit dem Flächeninhalt 5 bilden.

651016

Gegeben sind fünf Punkte durch ihre Koordinaten in einem rechtwinkligen Koordinatensystem: A(0,18), B(0,12), C(8,12), D(0,0) und E(24,0). Der Punkt S sei der Schnittpunkt der Geraden CD und BE. Der Punkt F sei der Schnittpunkt der Gerade AS mit der x-Achse.

- a) Berechnen Sie die Flächeninhalte des Dreiecks DFS und des Dreiecks FES.
- b) Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks CSE

Schulrunde

65. MathematikOlympiade in Baden-Wüttemberg



runde der 65. Mathematik	Olympia	de teilnehm	nen:
Vorname:			
Nachname:			
Klasse/Jahrgangsstufe	:		
Schulform:	□ G9	□ G8	\Box Andere Schulform
Email:(optional)			
runde der 65. Mathe standen. (Ohne diese erstellen und dich ni ☐ Ich bin damit einver	arbeitung ematik Ol e Zustimm cht zur nä erstanden,	der Daten ympiade du nung können ichsten Rur in den ko	zur Durchführung der Schul- ırch den WZBW e.V. einver- n wir für dich keine Urkunden
Ort, Datum:			Unitomoch wift das EU-sus
Unterschrift der Schüle	r n		Unterschrift der Eltern

Ich habe die Wettbewerbsaufgaben eigenständig gelöst und will an der Schul-